

LES OVINS



I Quelques termes généraux.

agneau	Mâle ou femelle de moins de 12 mois.
agnelle	Femelle de moins de 12 mois
bélier	mâle de plus de 12 mois
brebis	Femelle de plus de 12 mois
mouton	Espèce ovine en général
antennais(e)	Agneau ou agnelle né de l'année précédente et toujours inapte à la reproduction

Deux filières principales : la viande (90% de élevages), en plein air ou e bergerie
le lait (10%) dont les agneaux sont vendus non sevrés vers 45 jours.

Les différents types de race

Races précoces	Ile de France, Suffolk, Berrichon du cher, south down....
Races d'herbage	Charollais, bleu du Maine, rouge de l'ouest, vendéen, Texel, Avranchin...
Races rustiques	Préalpe de Sud, Lacaune viande, Limousine, Causse de lot...
Races Merinos	Mérinos de Rambouillet... orientés viande maintenant
Races prolifiques	Romanov
Races laitières	Lacaune, Manech, Basco-béarnais

NB :La race la plus petite du monde est l'Ouessant. Il sert dorénavant principalement de mouton d'agrément.

NB : La filière laine est devenue anecdotique.

NB : On écrit Charollais pour les ovins et Charolais pour les bovins.

NB : Il y a un Lacaune viande et un Lacaune lait.

II Reproduction.

Taux de fertilité	Brebis ayant mis bas / brebis mises en lutte
Taux de mise bas	Brebis ayant mis bas / brebis présentes
Taux de prolificité	Nombre d'agneaux nés / nombre de brebis ayant agnelé
Taux de mortalité	Nombre d'agneaux morts / nombre d'agneaux nés
désaisonnement	Reproduction en dehors de la période d'activité sexuelle naturelle donc en période de jours longs
flushing	Suralimentation énergétique pendant l'accouplement (3 semaines avant et 3 semaines après)
lutte	accouplement

agnelage	Mise bas
Brebis à l'entretien	Brebis vide, non gestante
Brebis épongée	Brebis sous traitement hormonal (éponges vaginales imprégnées de progestagènes) afin de grouper les chaleurs et de désaisonner.
Durée de gestation	145 jours +/- 10 jours
Durée du cycle	14 à 19 jours
Température rectale adulte	38,5
T° agneau	39/39,5

Le brebis ont une activité cyclique saisonnière (jours courts, donc du solstice d'été au solstice d'hiver).

Certaines races peuvent avoir des chaleurs plus tôt dans la saison (dès Juin/Juillet) : on parle de désaisonnement naturel.

En élevage, on va chercher à provoquer des cycles plus tôt grâce à différentes stratégies

Eclairage dans les bâtiments
Utilisation de la mélatonine (hormone produite la nuit) sous forme d'implants
Pose d'éponges vaginales imprégnées de progestagènes
Mise en présence d'un bœlier