

PRE ET POST OP SUR LES CHIRURGIES DU VEAU

REGLES GENERALES

PRE OP	OP	POST OP
Diète de 4 à 6 heures maximum. Pour un jeune veau au lait : la dernière tétée doit être annulée.	Les veaux sont à risque (hypothermie et hypoglycémie) donc l'anesthésie doit être la plus courte possible.	Tenir au chaud, surtout pendant la phase de réveil. Perfusion glucose et surveiller la glycémie sur des veaux faibles.

QUELQUES CHIRURGIES COURANTES ET LEUR SPECIFICITES

CHIRURGIE	PRE OP, ANESTHESIE ET CONTENTION	TECHNIQUE OP	SOINS POST OP	COMPLICATIONS
HERNIE OMBILICALE	Diète Anesthésie générale ou locale selon la taille. Décubitus dorsal.	Suture musculaire après dissection du sac herniaire ou pose de plaque rigide si >20 cm	Antibiotiques Mettre sur litière propre. Pansement à refaire 24 heures plus tard et enlever 48 heures après chirurgie.	Abcès péritonite. Récidive par rupture des ligatures.
ABCES OMBILICAUX	Diète. Commencer les antibiotiques 48 heures avant l'intervention. Anesthésie générale ou locale. Décubitus dorsal.	Selon les cas : Persistence du canal de l'ouraque (vers la vessie). Abcès de la veine hépatique	Antibiotiques 5 jours strict minimum et anti-inflammatoires. Litière propre. Entretien du drain	Abcès de paroi Péritonite Eventration.
SYNDROMES OCCLUSIFS	Limiter l'anesthésie au strict minimum. Chirurgie souvent pratiquée en urgence.	Selon les cas : invaginations SDT caillette occlusions	Perfusion massive. Antalgiques.	Reprise du transit indispensable sous 48 heures
ARCURE BOULETURE	Diète. Anesthésie de courte durée. Décubitus latéral.	Bouleture : Ténotomie des perforés et perforants. Arcure:Ténotomie des fléchisseurs.	Antibiotiques. Pose d'une attèle gouttière et résine pendant 10 jours. A renouveler	Nécrose et ulcères localement. Echec si malformations osseuses associées.

			éventuellement. Litière épaisse et propre. Bien vérifier les extrémités	
JARRET DROIT	Diète. Anesthésie générale plus locale (si veau lourd). Séparer la chirurgie de l'autre jarret de 3 semaines.	Ténectomie du gastrocnémien pour les races allaitantes. Névrectomie (opération plus délicate).	Antibiothérapie. Litière propre. Isolement de 8 jours indispensable. Pansement.	Infections. Rupture totale de la corde du jarret.
MACROGLOSSIE	AG profonde. Intervenir au moins 15 jours après vêlage. PROSCRIRE les benzodiazépines	Garrot sur la langue incision en V. Si moins grave : fixation de la langue sur la joue	Antibiotique. Aide à la tétée le temps de la cicatrisation.	Rupture des sutures : langue bifide.