


PRIMO-VACCINATION CHAT/CHIEN

		Core ou non Core **	
	CHIENS		
C	Maladie de Carré	C	Paramyxovirus
H ou A	Hépatite de Rubarth	C	Adénovirus
P	Parvovirose	C	Parvovirus
Pi2+Bb	Toux de chenil	NC	Parainfluenza Bordetella bronchoseptica
L	Leptospirose	NC	Spirochete
	herpès-virose	NC	herpesvirus
	piroplasmose	NC	Babesia
	Borréliose de Lyme	NC	Borrelia
	Leishmaniose	NC	Leishmania
	CHATS		
C	Calicivirose	C	Calicivirus
R	Rhinotrachéite infectieuse féline	C	Herpès-virose
P ou T	Panleucopénie ou Typhus	C	Parvovirus
Ch	Chlamydiophilose *	NC	Chlamydia
FeLV ou L	Leucose	NC	Retrovirus

* nouveau nom de la chlamydiose

** vaccins **core** : injection sur tous les animaux (quel que soit le mode de vie).

Non core : uniquement sur les animaux à risque.

CORE	Chiot/chaton:injections à 8 semaines/12 semaines/16 semaines (pour la dernière, chiot ou chaton âgé de 16 semaines minimum) Animal de plus de 12 semaines : 2 injections à 4 semaines d'intervalle
NON CORE	Protocole classique. Leucose et Leptospirose <u>toujours</u> en 2 injections.

Le premier rappel annuel est à effectuer 1 an au plus tard après la dernière injection du protocole de primo-vaccination.

Les **effets indésirables** graves sont très rares.

Plus le nombre de valences injectées est grand, plus le risque de réaction est élevé.

Cliniquement : réaction locale, fièvre, anorexie, fatigue..dans les 72 heures après la vaccination.

Un oedème de la face est possible.

La présence d'anticorps maternels est la première cause d'échec de vaccination chez les jeunes.